



# AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

www.srpv-poitoucharentes.com

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

## POITOU - CHARENTES

Bulletin Technique n° 26 du 19 Septembre 2001 - 1 page

### Grandes Cultures

#### COLZA : Stade cotylédons à 5 feuilles

##### Ravageurs

##### Grosses altises

Trois captures à ce jour, une en Vienne, une en Deux-Sèvres et une en Charente.

*Ne pas intervenir.*

##### Petites altises

Le manque d'eau et les températures très largement inférieures aux Normales saisonnières n'ont pas favorisé l'implantation rapide de la culture. D'assez nombreuses parcelles n'ont pas encore atteint le stade B2 qui marque la fin de sensibilité au ravageur. Malgré des conditions climatiques pas vraiment favorables, les petites altises sont **toujours présentes** sur de nombreuses parcelles.

*La stratégie générale (avec les risques d'efficacités insuffisantes évoquées dans le précédent bulletin) reste d'actualité. A partir de B2, ne plus intervenir.*

##### Tenthredes

Les captures diminuent (604 à ce jour), le vol n'atteindra pas le niveau de l'automne 2000 (1217 captures). Les conditions climatiques deviennent défavorables à la fois au vol, aux dépôts de pontes et à l'éclosion des larves. On n'observe pas encore de dégâts de larves et ceux-ci seront en principe moins importants que l'année passée.

*Maintenir la surveillance (voir bulletin précédent).*

##### Noctuelles terricoles

Quelques dégâts avec présence de larves sont encore signalés.

*Intervenir sur les parcelles concernées avec une pyrèthrinoïde en soirée, dans un volume d'eau important (> 250 l/ha).*

##### Maladies

##### Phoma

Le suivi biologique est réalisé en collaboration avec le CETIOM.

La notation maturation des périthèces est effectuée à Biard. Les projections de spores sont observées à partir des pièges classiques (passifs) mis en place à Biard (86), Périgny (17) ainsi qu'au Magneraud (17).

Sur ce dernier site, le CETIOM dispose également d'un piège dynamique.

La maturation des périthèces a légèrement progressé depuis une dizaine de jours mais reste à un faible niveau. Aucune projection de spores n'a été observée à ce jour.

*Ne pas envisager d'intervention à court terme.*

## TOUTES CULTURES

### Campagnols

Des piégeages ont été effectués du 11 au 13 dans le secteur d'Aiffres-Villiers en plaine (79). Les densités sont très faibles dans les refuges (90/ha) et pratiquement nulles en cultures fourragères et prairies (0 à 25/ha).

*Pas de risque sur le court terme.*

### COLZA

**Petites altises, Tenthredes :**  
Maintenir la surveillance

### Réunion régionale GRANDES CULTURES

Vendredi 30 Novembre 2001

au Lycée Agricole de Melle (79)

Journée d'information organisée par le SRPV et la FREDEC

Principaux résultats d'études et d'expérimentation

Service Régional de la  
Protection des Végétaux  
13, route de la Forêt  
86 580 BIARD  
Tél: 05.49.62.98.25  
Fax: 05.49.62.98.26

Directeur gérant :  
L. JUILLARD-CONDAT

Site internet :  
www.srpv-  
poitoucharentes.com

E-mail :  
srpv.draf-poitou-  
rentes@agriculture.gouv.fr

Publication périodique  
C.P.A.P. n°2139 AD  
ISSN n°02294 470

D340 J 40830 7184